

# LES RECOMMANDATIONS

## ANTICOAGULANTS

En général, il n'y a pas d'arrêt pour une chirurgie dentaire (des exceptions sont possibles)

## TRAITEMENTS CANCÉREUX

Un bilan dentaire doit être réalisé pour traiter les foyers infectieux et inflammatoires avant la mise en place d'un traitement. Il est nécessaire de le rappeler au patient s'il n'a pas été fait.

## CORTICOÏDES ORAUX PAR SPRAY

La bouche doit être rincée à l'eau après utilisation (risque pour les muqueuses et augmentation du risque carieux)

## PATIENTS DIABÉTIQUES

Il faut veiller à :

- effectuer un nettoyage interdentaire ;
- éviter une inflammation gingivale ;

L'équilibre de la glycémie est nécessaire. Une glycémie non régulée peut augmenter le risque infectieux et induire un défaut de cicatrisation

## BIPHOSPHONATES

Un bilan bucco-dentaire doit être réalisé avant la première prise. Un suivi est ensuite nécessaire tous les 6 mois.

## ANTIPARKINSONNIEN, NEUROLEPTIQUES, ANXIOLYTIQUES, ANTIDÉPRESSEURS

Ces traitements augmentent le risque carieux et favorisent la sécheresse buccale. L'utilisation de dentifrices à haute teneur en fluor est recommandée. Si une gêne apparaît, des gels et de la salive artificielle existent.

Programme de lutte contre l'antibiorésistance : **le traitement des pathologies bucco-dentaire représente le 2ème poste de prescription d'antibiotiques en France.**

Cela pourrait être évité par un meilleur suivi de la population.  
Les patients sont malheureusement vus trop tard dans les cabinets.  
Un bon suivi évite ces situations.

Message porté par les URPS Chirugiens-Dentistes et Pharmaciens Pays de la Loire en partenariat avec l'ARS Pays de la Loire et l'UFSBD

# LES RECOMMANDATIONS

## Les nouvelles recommandations de l'UFSBD en matière de fluor dans les dentifrices



Brossage des dents  
2 fois / jour



Recracher l'excès  
de dentifrice sans rincer



Brossage réalisé par un adulte  
jusqu'à 5 ans et supervisé par  
un adulte jusqu'à 7-8 ans



6 mois - 2 ans

2 - 3 ans

3 - 6 ans

à partir de 6 ans et  
jusqu'à l'âge adulte

Risque  
cariéux  
faible



Trace de dentifrice **1000 ppm**  
dans la largeur de la brosse à dents

Petit pois de  
dentifrice **1000 ppm**

Dentifrice  
**1000-1450 ppm**

Risque  
cariéux  
élevé



Trace de dentifrice  
**1000 ppm** dans la largeur  
de la brosse à dents

Petit pois de  
dentifrice **1000 ppm**

Petit pois de  
dentifrice **1450 ppm**

Jusqu'à 10 ans : dentifrice = **1450 ppm**  
De 10 à 16 ans : dentifrice = **2500 ppm**  
Au-delà de 16 ans : dentifrice = **5000 ppm**

ufsbd  [www.ufsbd.fr](http://www.ufsbd.fr)

## Vous souhaitez aller plus loin ?

- [Replay de la soirée régionale de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire](#)
- [Les dispositifs de promotion de la santé](#)
- [www.mabouchemasante.fr/](http://www.mabouchemasante.fr/)



Cliquez sur les liens  
pour en savoir plus



Message porté par les URPS Chirurgiens-Dentistes et Pharmaciens Pays de la Loire  
en partenariat avec l'ARS Pays de la Loire et l'UFSBD

URPS  
CHIRURGIENS-DENTISTES  
DES PAYS DE LA LOIRE

URPS  
Pharmaciens  
PAYS DE LA LOIRE

ARS  
Agence Régionale de Santé  
Pays de la Loire

ufsbd   
www.ufsbd.fr